



Eradikationsplan Helicobacter pyloris

Sehr geehrte/er Patient/in,

wir stellten bei Ihnen eine Infektion der Magenschleimhaut mit Helicobacter Pylori (kurz HP) festgestellt. Es handelt sich dabei um ein Bakterium, das im Magen und Dünndarm Geschwüre hervorrufen kann. Es ist auch in vielen Fällen für Magenschleimhautentzündungen verantwortlich. Diskutiert wird auch eine Begünstigung einer besonderen Form von Magenkrebs. In Ihrem Fall nach Sichtung der vorliegenden Befunde und der Beschwerden rate ich Ihnen zur Behandlung (**Eradikation**) dieser Infektion. Um den Behandlungserfolg zu kontrollieren, ist 4 Wochen nach Abschluß der Behandlung ein HP-Atemtest oder eine erneute Magenspiegelung inklusive Probeentnahme von Schleimhaut erforderlich.

Mehr Information finden Sie auf unserer Internetseite: www.dr-hohn.de unter der Rubrik „Leistungen“ >> „HP-Atemtest“.

Die Behandlung dauert nur 7 Tage. Bitte nehmen Sie die Medikamente sehr sorgfältig und regelmäßig jeden Tag ein, nur so wird die Behandlung erfolgreich sein. Sollten Allergien gegen die unten genannten Medikamente (auch Penicillinallergie) bekannt, sein, dürfen Sie diese nicht einnehmen, sondern müssen uns davon informieren.

Die Eradikation wird mit diesen 3 Medikamenten durchgeführt:

Clarithromycin, Amoxicillin und Omeprazol.

Mögliche Nebenwirkungen der Behandlung: möglich Wirkungslosigkeit der „Pille“, Durchfälle, Geschmacksstörungen, Allergien, Pilzinfektionen der Mund- oder Scheidenschleimhaut. Bitte Abbruch der Therapie nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.

Bitte nehmen Sie die Medikamente nach folgendem Plan:

Präparat	Morgens	Mittags	Abends
Omeprazol 20 vor dem Essen	1		1
Clarithromycin 500 nach dem Essen	1		1
Amoxicillin 1000 nach dem Essen	1		1